

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado, cerrado.
- Almacena el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados, máximo por 7 días. Para prolongar la vida útil del producto, mantener en refrigeración entre 4 a 8° C.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 2 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- No tiene antídoto específico, tratar sintómicamente.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA
 SAMU: 106**

SOLAGRO SAC: 914278470

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- El aplicador debe emplear las medidas necesarias para controlar la deriva.

BEAUVESOL

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

INSECTICIDA AGRICOLA

Composición:

Beauveria bassiana1 x 10¹² conidias viables/Kg
 Cepa SCB-12
 AditivosC.S.P 1Kg

Reg. N° 076 - SENASA - PBA - ACBM

TITULAR DEL REGISTRO:

SOLUCIONES AGROSOSTENIBLES S.A.C
 Av. Metropolitana Mz. F1 Lote 5, Urb. San Isidro.
 Trujillo – Perú. gestioncomercial@solagro.com.pe
www.solagro.com.pe

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

SOLAGRO

Av. Metropolitana Mz F1 Lote 5, Urb. San Isidro.
 Trujillo – Perú. gestioncomercial@solagro.com.pe
 RPC: 943776031 / 914278470

Contenido Neto:
 N° Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BEAUVESOL (Cepa SCB-12) es un hongo entomopatógeno que actúa por contacto directo sobre insectos plaga del orden Lepidóptera, Hemiptera, Coleóptera, Ortóptera y Homóptera; es recomendado dentro del MIP - en cultivos con manejo convencional y orgánico, *Beauveria bassiana* es un hongo imperfecto natural que pertenece a la subdivisión Deuteromycotina.

LAVADO DE ESPORAS: Por cada bolsa de 800 g de **BEAUVESOL**, preparar una solución de 1 ml de surfactante agrícola en 1 litro de agua, enseguida agregar todo el contenido de **BEAUVESOL** y agitar la mezcla hasta retirar todas las esporas del maíz; luego colar la suspensión de esporas a través de una malla fina para evitar el paso del maíz al tanque (repetir los lavados dos veces más hasta observar el color característico del maíz). Agitar la solución durante la inyección para mantener en suspensión las conidias.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

Cultivo	PLAGA		Dosis	PC	LMR
	Nombre Común	Nombre Científico		(Días)	(ppm)
ARANDANO	"Gallina ciega"	<i>Paranomala undulata peruviana</i>	10 kg/Ha	N.A.	N.A.
PALTO	"Gallina ciega"	<i>Paranomala undulata peruviana</i>	1.6 kg/200 L	N.A.	N.A.
MANGO	"Gallina ciega"	<i>Paranomala undulata peruviana</i>	1.6 kg/200 L	N.A.	N.A.

PC: Periodo de Carencia (días) LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm) N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE INOCULACION: Se recomienda realizar inoculaciones por sistema de riego o gravedad en horas de la mañana o de la tarde. Inocular de manera preventiva con baja población del insecto plaga. Entre 2 a 3 inoculaciones por campaña, según el cultivo. **Inoculación Foliar:** Realizar en horas de baja radiación solar (tarde o noche), usando un adherente foliar, con buena cobertura según la fenología del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

2 horas después de la inoculación

COMPATIBILIDAD: No mezclar con Fungicidas, productos cúpricos, alcalinos o que alteren la viabilidad del producto.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en el cultivo que se recomienda.

RESPONSABILIDAD CIVIL: EL Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCION

