

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Para el manejo de este producto es necesario tener en cuenta las medidas generales de precaución para los plaguicidas como:

- Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, fumar, ni beber durante la aplicación del producto.
- Terminada la aplicación, lavarse y bañarse con abundante agua y jabón
- No transportar, ni almacenar junto con alimentos y medicinas de uso humano y animal.
- Manipule los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
- Guardar en lugar fresco y seco, de bastante ventilación.
- Evítese la contaminación de las fuentes de agua, estanques y drenajes.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto, elimine la contaminación dérmica con agua y jabón.
- Trate la contaminación ocular con enjuagues de agua.
- Este caso de emergencia toxicológica llamar a los siguientes números:

SAMU: 106
SERFI S.A.: (01)-7104068

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.



AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICION :

Bacillus thuringiensis var. kurstaki,
32,000 unidades Internacionales de Potencia por mg6,4 %
Ingredientes inertes.....93,6 %

PBUA N° 023-SENASA

Formulado por:
**Marketing Arm
International Inc.**
P.O. Box 3816, Port Charlotte,
Florida 33949, USA

Importado y Distribuido por:

Serfi
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 710-4068

**Contenido Neto:
1 kg**

N° de Lote:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Bt-2X es un insecticida biológico a base de **Bacillus thuringiensis var. kurstaki**, el cual actúa por ingestión para control de insectos comedores de follaje, en cultivos tales como: algodón, col, frejol, maíz, espárrago, mandarina y palto. Es recomendable empezar las aplicaciones cuando se observan las poblaciones en los primeros estadios larvales.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Bt-2X se usa en pulverización sobre el follaje, para preparar la solución seguir los siguientes pasos: 1) Tratar con **BB5 Plus** toda el agua que se va usar en la aplicación, agregando **BB5 Plus** hasta que el agua cambie a color naranja. 2) Sacar un poco de agua tratada y diluir la dosis de **Bt-2X** hasta lograr una pasta. 3) Agregar la pasta al total del agua tratada con **BB5 Plus**. 4) Realizar la aplicación con buena cobertura para que las esporas de la bacteria queden distribuidas en toda la planta.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Nombre Científico	Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
			g/200 L	kg/ha		
Algodón	Gusano de Hoja	<i>Anomis toxana</i>	200	0,3 - 0,5	*	*
	Gusano perforador de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	200	0,2	*	*
Añandano	Gusano perforador de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	200 - 400	0,35 - 0,8 (1)	*	*
Frejol	Gusano medidor	<i>Pseudoplusia includens</i>	150 - 200	0,3 - 0,5	*	*
Col	Gusano comedor	<i>Plutella xylostella</i>	150 - 200	0,3 - 0,5	*	*
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	200	0,3 - 0,5	*	*
Espárrago	Comedor de follaje	<i>Copitarsia spp.</i>	200-300	0,5 - 0,9	*	*
Mandarina	Gusano perforador de frutos	<i>Argyrotaenia sp.</i>	200	0,3 - 1,0	*	*
Palto	Gusano del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	500	1,0 - 2,5	*	*
Pecano	Gusano del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	400-500	1,6 - 2,0	*	*

P.C. (días) = Periodo de Carencia L.M.R. (ppm) = Límite Máximo de Residuos

(1) Considerado para un gasto de agua de 350 - 400 L/ha

(*) Aun sin restricciones.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Empezar las aplicaciones cuando se observan las poblaciones en los primeros estadios larvales.

COMPATIBILIDAD

Bt-2X es incompatible con productos alcalinos

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de dosis.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características biológicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



PRECAUCION

