

Tamaño: 22.5 x 7 cms

14.07.22

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Para el manejo de este producto es necesario tener en cuenta las medidas generales de precaución para los plaguicidas como:

- Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, fumar, ni beber durante la aplicación del producto.
- Terminada la aplicación, lavarse y bañarse con abundante agua y jabón.
- No transportar, ni almacenar junto con alimentos y medicinas de uso humano y animal.
- Manipule los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
- Guardar en lugar fresco y seco de bastante ventilación.
- Evítese la contaminación de las fuentes de agua, estanques y drenajes.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto, elimine la contaminación dérmica con agua y jabón.
- Trate la contaminación ocular con enjuagues de agua.
- Este producto no tiene antídoto específico, todo tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106

SERFI: (01) 710-4068

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

VACÍOS: Para envases rígidos:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**AGENTE DE CONTROL
BIOLÓGICO MICROBIANO**

INSECTICIDA - NEMATICIDA BIOLÓGICO

POLVO MOJABLE (WP)

Composición

Metarhizium anisopliae..... 2 x 10⁸ ufc/g
Purpureocillium lilacinum..... 5 x 10⁷ c/g
Aditivos..... c.s.p. 1g

PBUA N° 074-SENASA
Titular del Registro: Serfi S.A.

Formulado y Distribuido por:



Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 51 (1) 710-4068

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Exp.:

CONTENIDO NETO: 100 g

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Es un producto a base de esporas de latencia de los hongos *Metarhizium anisopliae* y *Purpureocillium lilacinum* los cuales bio-regulan las poblaciones de insectos plaga en el campo, evitando que causen daño económico al cultivo. **URPI** se debe diluir en un litro de agua y agregar luego al resto de agua que se usará en la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	PLAGA		Dosis (g/HA)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Banano	Nemátode barrenador	<i>Radopholus similis</i>	300 - 400	N.A.	N.A.
Espárrago	Mosquilla de los Brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	200	N.A.	N.A.
Papa	Nemátodo del quiste de la papa	<i>Globodera pallida</i>	400 - 500	N.A.	N.A.
Vid	Nemátodo del nudo de la raíz	<i>Meloidogyne incognita</i>	300 - 400	N.A.	N.A.

P.C.: Periodo de carencia (días). L.M.R: Limite máximo de residuos (ppm) N.A.: No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar el producto 2 veces, con frecuencia de 20 días. La primera al inicio de la siembra. Para cultivos perennes, la primera aplicación es al inicio de la campaña.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCION

