Una empresa anasac

hortus

Neemix®4.5

Reg. PBUA N° 133 – SENASA

CARACTERÍSTICAS GENEREALES

Neemix 4.5 es un insecticida biológico extraído de las semillas de árbol de Neem. La Azadirachtina, del grupo de los limonoides, es el de mayor actividad y espectro sobre distintas especies de insectos plaga. Puede usarse en agricultura orgánica y/o convencional. Los tejidos tratados llegan a ser desagradables a los insectos y algunas especies prefieren morir de hambre, por ello se reconoce que tiene efecto repelente (antigustativo)

FORMULACIÓN

Neemix 4.5 es un insecticida agrícola, biológico, formulado como Concentrado Emulsionable (EC). Contiene *Azadirachtina* 45 gramos por litro de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO

Botánico: Limonoides

MODO DE ACCIÓN

Neemix 4.5 actúa bloqueando el crecimiento y reproducción de los insectos. Reduce la oviposición de los insectos. Actúa por ingestión, tiene acción translaminar.

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Tel 717 - 9040 / 717-9041
E-mail: ventas@hortus.com.pe / **www.hortus.com.pe**

Neemix®4.5

CUADRO DE USOS

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/Ha)	(ml/200L)		
Alcachofa	Mosca Minadora	*Liriomyza huidobrensis*	0.25 - 1.0	125 - 500	N.A.	N.A.
Espárrago	Trips (**)	*Trips tabaci*	0.25 - 0.5	125 - 250		
	Mosquilla de los brotes(***)	*Prodiplosis longifila*	0.25 - 1.0	125 - 500		
Holantao	Mosca Minadora	*Liriomyza huidobrensis*	0.5 - 1.0	90 - 170		
Mandarina	Minador de los cítricos (***)	*Phyllocnistis citrella*	0.25 - 0.5	125 - 250		
Páprika	Mosca blanca (*)	*Bemisia tabaci*	1	380		
	Mosca minadora	*Liriomyza huidobrensis*	0.25 - 0.5	100 - 200		
	Mosquilla de los brotes(***)	*Prodiplosis longifila*	0.25 - 0.5	100 - 200		
	Enrrollador de hojas	*Lineodes integra*	0.5 - 1.0	170 - 340		
Tomate	Mosca blanca (**)	*Bemisia tabaci*	1.0	350		
	Mosca minadora	*Liriomyza huidobrensis*	0.25 - 0.5	90 - 180		
Vid	Trips	*Frankliniella occidentalis*	2	400		
Palto	Mosca blanca	*Aleurodicus juleikae*	-	200 - 300		
Arándano	Mosca blanca	*Aleurodicus juleikae*	-	300 - 400		
	Cochinilla harinosa	*Planococcus citri*	-	300 - 500		
Limón	Ácaro del tostado	*Phyllocoptruta oleivora*	-	200 - 300		

P.C.: Periodo de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos en ppm. N.A.: No aplica.

(*) Las dosis sugeridas por 200L son referenciales y están de acuerdo a previa calibración de equipos para abarcar con la fumigación todo el cultivo. (**) Se recomienda aplicar en mezcla con un aceite vegetal a la dosis de 0.5 - 0.75 / 200L. (***) Realizar aplicaciones dirigidas al brote con bajas dosis y en mezcla con aceite vegetal a intervalos de 7 días y/o rotando con otros productos.

RECOMEDACIONES

- Se usa principalmente para control de larvas y ninfas de insectos plagas.
- El agua debe acondicionarse a un pH 6.0
- Realice las aplicaciones en horas de baja insolación, puede ser muy temprano en la mañana o pasadas las 4:0 pm.
- Calibre el equipo y para garantizar una buena cobertura.
- Use la dosis recomendada para el cultivo.
- Debe usarse dos veces consecutivas a intervalos de 7 a 9 días con la finalidad de romper el ciclo de la plaga.

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Tel 717 - 9040 / 717-9041
E-mail: ventas@hortus.com.pe / **www.hortus.com.pe**

* Use equipos de protección personal recomendados en la etiqueta.

Neemix® 4.5

COMPATIBILIDAD

Neemix 4.5 es compatible con los plaguicidas y fertilizantes foliares comúnmente usados. En caso de dudas se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendados.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada antes de 4 horas transcurridas desde la aplicación.

SEGURIDAD

* No corrosivo, No inflamable, No explosivo.
* PRECAUCIÓN por lo que tiene banda se seguridad de color VERDE.
* Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Tel 717 - 9040 / 717-9041
E-mail: ventas@hortus.com.pe / **www.hortus.com.pe**