

26 x 15 cms



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo o la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Chlorantriliprole: Diamidas/ Lambda-cyhalothrin: Piretroide
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión: No provocar el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación: Trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con los ojos: Levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106, Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú: (1) 434-5600, CISPROQUIM: 0800-50-847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- "Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin".
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos beneficiosos. Evitar la aplicación en época de floración, ni cuando se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o en cultivos aledaños.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Aplicar temprano por las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

AMPLIGO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición

Chlorantriliprole 100 g/L
Lambda-cyhalothrin 50 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N°: 1333-SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A.
Sucursal del Perú.
Av. Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados, Santiago de Surco, Lima - Perú
Teléfono: (01) 434-5600



Formulado por:

Syngenta Production France S.A.S
Francia

Distribuido por:

TQC
TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes No 311,
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima - Perú.
Telf: (01) 612-6565, Fax: 348-1020
R.J.C N° 20307150981

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Contenido Neto:
1Litro

Los nombres de producto que contengan ® o TM
El logo de SYNGENTA y el marco CP FRAME
son marcas comerciales de una compañía del Grupo Syngenta

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Modo y mecanismo de acción: AMPLIGO® es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso del insecto y deteniendo inmediatamente la alimentación. Compuesto por Chlorantriliprole y Lambda-cyhalothrin. Chlorantriliprole causa parálisis y finalmente la muerte del insecto. Lambda-cyhalothrin interfiere con el sistema nervioso central de los insectos.

Modo de empleo: Aplicar con equipo terrestre (manual, atomizadora, estacionaria o tractorizado) que cuente con boquillas adecuadas. Se debe calibrar el equipo y el ritmo de aplicación.

Para el manejo de la resistencia, rotar con productos de diferentes grupos químicos y de diferentes mecanismos de acción.

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(L/ha)	L /200 L		
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.30	30	30	*0.01/**0.01
	Copitarisia corruda	<i>Copitarisia corruda</i>				
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Polilla del tomate	<i>Tuta absoluta</i>	0.25		3	*0.6/**0.1
	Gusano perforador	<i>Chloridea virescens</i>	0.3-0.35			
	Gusano ejército	<i>Spodoptera eridania</i>				
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15	30	30	*0.02/**0.02
Brocoli (<i>Brassica oleracea</i>)	Palomilla del dorso de diamante	<i>Plutella xylostella</i>	0.3		1	*4/**0.4
	Pimiento (<i>Capsicum annum</i>)	Polilla del fruto	<i>Symmetrichema capsicum</i>	0.25		7
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Gusano perforador	<i>Chloridea virescens</i>	0.30			
	Gorgojo de los andes	<i>Premnotrypes suturellus</i>		0.25	30	*0.02/**0.01
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Barreno de la caña	<i>Diatraea saccharalis</i>		0.15-0.20	15	*0.4/**1

PC: Periodo de Carencia, LMR: Limite Máximo de Residuos. *Chlorantriliprole, **Lambda-cyhalothrin. Para cultivos de exportación dar aplicación a los requerimientos exigibles según el país de destino.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar a penas observe los primeros daños. Hacer 2 aplicaciones por campaña/año en espárrago, maíz, brocoli y pimiento y 1 en tomate, papa y arroz.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: AMPLIGO® puede ser mezclado con la mayoría de los insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. Se recomienda elaborar una pre-mezcla de pequeña escala para estudiar la compatibilidad de los productos.

FITOXICIDAD: La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El Titular del Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



6 pts

6 pts

6.3 pts