

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Utilizar máscaras y guantes protectores durante la aplicación del producto. No ingerir alimentos ni fumar. Luego de efectuada la aplicación, lavar con agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al producto. Cambiarse de ropa. Enjuagar el equipo utilizando abundante agua. Evitar la inhalación y el contacto directo con la piel. No verter los residuos de la aplicación en acequias, desagües, lagos o ríos. No almacenar, ni transportar el producto con alimentos, bebidas, ni medicinas. Mantener el producto en sus envases originales herméticamente cerrados y guardarlo en lugar fresco.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo Químico: Piretroide  
Acuda de inmediato al médico, hacer reposar al paciente en un ambiente fresco, lavar las partes expuestas al contacto, abrigarlo bien.

**INDICACIONES PARA EL MEDICO:**

En caso de ingestión del producto, tratar sintómicamente. En caso necesario acudir al médico. Mientras tanto, provóquese el vómito dando de beber al paciente agua tibia con sal. Mantenerlo en reposo. De producirse irritaciones en la piel lavar con un jabón alcalino.

**ANTÍDOTO:**

No se ha determinado antídoto específico.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:**

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPQUIM: 0800-50847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques. Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos. Tóxico a peces, aplicar lejos de fuentes de agua. Tóxico a abejas.



**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA**

**INSECTICIDA AGRICOLA**  
**Concentrado Emulsionable (EC)**

Composición:

Deltametrina, 25 g/L  
Aditivos, csp 1 L

Reg. N° 219-96-AG-SENASA

**Titular del Registro:**

Bayer S.A.  
Paseo de la República 3074  
Piso 10. San Isidro.

**Formulado por:**

Bayer S.A.  
Av Américas 57-52  
Bogotá DC - Colombia

**Importado y distribuido por:**

Bayer S.A.  
Paseo de la República 3074  
San Isidro, Lima - Perú  
Telf. 2113800

**NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**



**Contenido Neto: 1 litro**

Lote N.  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:



® - Marca Registrada del grupo Bayer

**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

DECIS 2.5 EC es la síntesis del isómero más activo de deltametrina, grupo piretroide. Actúa por contacto e ingestión y tiene efectos lipofílicos por esto su efecto inicial es inmediato y su residualidad bastante larga.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"**

| CULTIVO                 | PLAGA   |                                 | DOSIS      |      | PC* (días) | LMR** (ppm) |
|-------------------------|---|---------------------------------|------------|------|------------|-------------|
|                         | NOMBRE COMUN  | NOMBRE TECNICO                  | %          | l/ha |            |             |
| ALGODON                 | Arrebiatado<br>Gusano rosado  | <i>Dysdercus peruvianus</i>     | 0.15       | 0.8  | 30         | 0.02        |
|                         |   | <i>Pectinophora gossypiella</i> | 0.1        | 0.5  |            |             |
| TOMATE                  | Gusano del fruto<br>Gusano verde medidor  | <i>Prodenia eridania</i>        | 0.1        | 0.5  | 7          | 0.3         |
|                         |   | <i>Pseudoplusia includens</i>   | 0.1        | 0.5  |            |             |
| PAPA                    | Mosca minadora<br>Pulgilla saltona  | <i>Liriomyza huidobrensis</i>   | 0.15       | 0.8  | 1          | 0.01        |
|                         |   | <i>Epitrix sp.</i>              | 0.1        | 0.5  |            |             |
| ALFALFA                 | Caballada<br>Cogollero  | <i>Anticarsia gemmatalis</i>    | 0.1        | 0.5  | 28         | 0.02        |
|                         |   | <i>Epinotia aporema</i>         | 0.1        | 0.5  |            |             |
| REPOLLO, COL, COLIFLOR  | Gusano verde medidor<br>Gusano perforador de hojas  | <i>Pseudoplusia includens</i>   | 0.1        | 0.5  | 7          | 0.1         |
|                         |   | <i>Plutella xylostella</i>      | 0.1        | 0.5  |            |             |
| TABACO                  | Gusano verde medidor<br>Cachudo<br>Pulgilla saltona   | <i>Pseudoplusia includens</i>   | 0.1        | 0.5  | 7          | N.d.        |
|                         |   | <i>Manduca sexta</i>            | 0.1        | 0.5  |            |             |
|                         |   | <i>Epitrix sp.</i>              | 0.1        | 0.5  |            |             |
|                         |   | <i>Epitrix sp.</i>              | 0.1        | 0.5  |            |             |
| FRIJOL, SOYA, VAINITA Y | Perforador de brotes<br>Mosca minadora<br>Gusano verde medidor<br>Pegador de hojas<br>Perforador de brotes y vainas | <i>Epinotia aporema</i>         | 0.1        | 0.5  | 7          | 0.2         |
|                         |   | <i>Liriomyza huidobrensis</i>   | 0.15       | 0.8  |            |             |
|                         |   | <i>Pseudoplusia includens</i>   | 0.1        | 0.8  |            |             |
|                         |   | <i>Omiodes indicata</i>         | 0.1        | 0.5  |            |             |
|                         |   | <i>Laspeyresia leguminis</i>    | 0.1        | 0.5  |            |             |
| CEBOLLA, AJO            | Thrips  | <i>Thrips tabaci</i>            | 0.1        | 0.5  | 7          | 0.05        |
| ESPARRAGO               | Thrips  | <i>Thrips tabaci</i>            | 0.1        | 0.5  | 3          | 0.05        |
| VID                     | Thrips  | <i>Thrips tabaci</i>            | 0.05-0.075 | --   | 3          | 0.2         |

NOTA: Emplear la dosis en porcentaje (%) ó ml/cil cuando se use pulverizadora manual; para aplicaciones en avión, tractor o mochila a motor emplear la dosis en l/ha previa calibración del gasto de agua por ha.

\*PC = Periodo de Carencia (días) \*\*LMR = Limite Máximo de Residuos (ppm) N.d = No determinado

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar previa evaluación y según nivel de daño económico de las plagas en el cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO:** 24 horas

**COMPATIBILIDAD:** DECIS 2.5 EC es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común excepto con productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

