

**Exirel** 

Potenciado por  
**CYAZYPYR®**

 **Farmex**  
Vínculos Fértiles

**FMC** | An Agricultural Sciences Company

Por la  
**CONFIANZA**



**Exirel lleva tu  
producción mucho  
más lejos.**

**Exirel** 

Potenciado por  
**CYAZYPYR®**


Composición: Cyantraniliprole 10%  
Clase y modo de acción: INSECTICIDA-28 (IRAC)  
Formulación: Suspoemulsión (SE)  
Clase toxicológica: Ligeramente peligroso  
Banda: Azul

La formulación de **Exirel** 10 SE (suspoemulsión) ha sido especialmente estudiada para una rápida penetración en los tejidos vegetales y una rápida traslocación hacia el interior de los mismos. Gracias a ello permite controlar insectos particularmente difíciles en frutales de exportación.

**Exirel** potenciado por **Cyazypyr®** es un insecticida de tecnología **FMC**, perteneciente al grupo químico de las Diamidas Antranílicas. **Su novedoso mecanismo de acción**, actúa como agonista (activador) de los receptores de Rianodina, afectando la contracción muscular e impidiendo que los insectos se alimenten causando parálisis, letargia y posteriormente la muerte.

### Innovador mecanismo de acción

**Exirel** potenciado por **Cyazypyr®** actúa principalmente por ingestión ocasionando una rápida detención del daño. Al ser ingerido, **Exirel** causa en la plaga pérdida en la movilidad, disminución en la actividad mandibular, cardíaca y respiratoria. Finalmente hay una parálisis total y muerte de la plaga. **Exirel** es un potente insecticida con acción complementaria sobre huevos próximos a la eclosión (acción ovicularvicida).



### Tabla de tolerancias

Tabla de tolerancias  
Tabla de tolerancias. Límite de residuos de plaguicidas para Vid(ppm)

PRINCIPIO ACTIVO	Brasil	Canadá	China	Corea	Hong Kong	India	Japón	Rusia	USA	Reino Unido	Unión Europea
Cyantraniliprole	1,5	1,5	4	1	ST	0,01	2	1,5	2	1,5	1,5

ST: Sin tolerancias o LMR no establecido.

### Recomendación en el cultivo de Vid

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
VID	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.2-0.3	10	1
	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.2-0.25		

### Ventajas Exirel

- Afecta todos los estadios de la plaga. (adulto, larvas o ninfas y huevos).
- Espectro cruzado de control.
- No mancha la fruta.
- Excelente resistencia al lavado por lluvias.
- Seguro para las personas y medio ambiente.
- Aceptado en los principales destinos de exportación.



En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico o al centro de información toxicológica (24 horas): Cisproquim línea gratuita: 0800-50847 Central de urgencias y emergencias de EsSalud 117 ó 0801-10200

Antes de usar nuestros productos, lea y entienda las recomendaciones de la etiqueta.

Farmex S.A. RUC: 20100141583

 @farmex.pe

www.farmex.com.pe

 **Farmex**  
Vínculos Fértiles