

TML PLUG

Registro SENASA: 368-SENASA-PBA-SQ

Certificado INDECOPI: N° 00283376

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto : TML PLUG

Ingrediente activo : Trimedlure

Clase de uso: Feromona para Ceratitis Capitata

Color: Rojo/Rosado

Peso: 3gr a 6gr

Toxicidad: No toxico

Características del empaque: En envase individual en bolsas bilaminadas, interior de aluminio; herméticamente sellada.

Presentación del producto: bolsas de Polietileno x 100und.

Actividad en el campo: 06-08 semanas

Fecha de expiración: 3 años

Formulador: ITRAP Technologies Inc.

Procedencia: California, EE.UU

Titular del registro: FETA SERVICIOS GENERALES

COMPOSICIÓN :

CHEMICAL NAME	OTROS NOMBRES	W/W%
Cyclohexanecarboxilic acid 4 – (or 5) chloro 2 – methyl, thert butil ester	TRIMEDLURE	95
Other ingredient		5

RECOMENDACIONES DE USO

Nombre de la especie ***Ceratitis capitata*** (familia Tephritidae) mosca del Mediterráneo

Situación de la plaga:

Esta es una plaga muy importante en la fruticultura mundial, distribuida desde el Mediterráneo, África Central y América del Sur y Australia Occidental. La hembra pone sus huevos debajo de la superficie de la fruta, las larvas se alimentan de la pulpa de las frutas, haciendo galerías internas.

TRAMPAS

Estas Feromonas puedes ser utilizadas en las trampas Jackson o en las trampas multilure, esta feromona actúa como atrayente sexual de machos de mosca del mediterráneo (Ceratitis capitata)

DENSIDAD DE MONITOREO

Las trampas deben colocarse a la altura del tercio medio superior de la planta dentro de la copa de los árboles, y una ubicación céntrica, se puede utilizar 2 a 4 trampas por hectárea en plantaciones uniformes y en caso de zonas irregulares se recomienda 1 trampa por hectárea.

CAMBIO DE FEROMONA Y MANTENIMIENTO DE TRAMPAS

Estas feromonas deben cambiarse cada 6 a 8 semanas, esto dependiendo de las condiciones ambientales de temperatura y condiciones de campo. En zonas polvorientas han llevado un deterioro de las superficies de la feromona.